LES DANGERS DU PROTOXYDE D'AZOTE

Des effets hilarants :

- Rire, ivresse, sentiment de joie
- Déformation de la vue
- Gain d'énergie
- Déformation des sons

Des effets pas si marrants :

Manque d'oxygène (indispensable au fonctionnement du cerveau et des organes), qui peut **entraîner une asphyxie** (perte de connaissance « on tombe dans les pommes »)

Risque de brûlures si on est en contact direct avec la capsule

Perte du réflexe de la toux avec un **risque de « fausse route »**

Risque de chutes



Autres effets possibles :

- Nausées / vomissements, diarrhées
- Vertiges
- Maux de tête
- Pensées brouillées, perte de mémoire
- Perte de repères, du temps / de l'espace

MAIS AUSSI des problèmes neurologiques avec :

- Diminution des sens (vue, audition, toucher)
- Difficulté à coordonner les mouvements, à parler
- Fourmillements / engourdissements des doigts / des orteils
- Fatigue importante qui dure dans le temps



Effets sur le long terme :

- Hallucinations visuelles
- Troubles de l'érection
- Humeur changeante (parano)
- Palpitations et cœur qui bat trop vite
- Trous de mémoire
- Besoin de prendre des doses plus fortes pour garder les mêmes effets
- Lors de l'arrêt après des prises importantes et prolongées : anxiété, agitation, maux de ventre, etc...

Possibles problèmes neurologiques qui sont parfois définitifs :
engourdissements des doigts et des orteils, difficulté à marcher, sensations de décharges électriques dans la nuque, paralysie des jambes, etc.