

Bilan départemental et régional du piégeage de printemps du frelon asiatique

Campagne 2026 – Normandie

1- Contexte

Le frelon asiatique (*Vespa velutina*) constitue aujourd'hui une menace importante pour l'apiculture, la biodiversité et, plus largement pour les écosystèmes. Depuis plusieurs années, les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) de Normandie coordonnent une campagne de piégeage de printemps visant à limiter le développement de cette espèce invasive.

La campagne 2026 s'est déroulée d'environ du 03 mars 2026 au 15 mai 2026, grâce à la mobilisation de nombreux apiculteurs, particuliers et collectivités.

L'objectif principal était de capturer les fondatrices avant la création de nouveaux nids.


Le mélange attractif utilisé était majoritairement composé de :

- 1/3 de vin rouge
- 1/3 de bière
- 1/3 de sirop


2- Résultats départementaux

Département	Pièges	FA	FE	Rendement
Eure	299	16 973	3 947	56.8
Orne	218	20 625	5 199	94.6
Calvados	77	10 976	1 896	142.5
Manche	178	28 731	6 496	161.4

Répartition des quantités de FA par département



Répartition du nombre de piège par département



Eure :

Avec 299 pièges, l'Eure est le département ayant mobilisé le plus grand nombre de participants. Les pièges ont permis la capture de 16973 frelons asiatiques soit près d'un tiers des captures régionales. Le rendement moyen est de 56.8 frelons asiatiques par piège, inférieur à celui observé dans les autres départements, ce qui peut refléter une densité de piégeage plus importante ou une pression locale différente.

Orne :

L'Orne comptabilise 218 pièges pour 20625 frelons asiatiques capturés. Le rendement atteint 94.6 frelons par piège. Ces résultats traduisent une bonne efficacité du dispositif déployé.

Calvados :

Bien qu'il n'y ait eu que 77 pièges de recensées, ils ont permis la capture de 10976 frelons asiatiques. Le rendement atteint 142.5 frelons asiatiques par piège, ce qui en fait l'un des meilleurs résultats régionaux

Manche :

Avec 28731 frelons asiatiques capturés, la Manche enregistre le plus grand nombre de capture. Le rendement de 161.4 frelons asiatiques par piège est également le plus élevé de la région. Ces résultats mettent en évidence une pression particulièrement importante du frelon asiatique sur ce territoire.

3- Synthèse régionale

Chiffres clés

- **772 pièges installés**
- **77 305 frelons asiatiques capturés**
- **17 538 frelons européens ainsi que d'autres insectes en très faibles quantités notamment des mouches, guêpes, abeilles, et papillons qui ont pu ressortir du piège ou être libérés**
- **104 frelons asiatiques capturés par piège en moyenne**

Principaux enseignements :

La campagne 2026 confirme la forte mobilisation des acteurs normands.

L'ensemble des départements présente des résultats significatifs, avec une efficacité particulièrement marquée dans la Manche et le Calvados.

L'Eure reste le département le plus mobilisé en nombre de pièges installés.

Les résultats démontrent l'intérêt du piégeage de printemps lorsqu'il est coordonné à l'échelle régionale.

4- Conclusion

La campagne de piégeage de printemps 2026 a permis la capture de près de 77 305 fondatrices de frelons asiatiques sur le territoire normand.

Grâce à la mobilisation des réseaux GDS, des apiculteurs, des collectivités et des particuliers, cette action contribue à limiter la création de nouveaux nids et à réduire la pression exercée sur les colonies d'abeilles et les pollinisateurs sauvages.

La poursuite de cette dynamique régionale associée à une harmonisation des pratiques et au maintien de la mobilisation des participants, constituera un levier essentiel pour renforcer l'efficacité des campagnes futures.

De plus, nous avons également eu de très nombreux retours concernant l'efficacité et la sélectivité du piège avec un très bon niveau de satisfaction globale, que ce soit par les apiculteurs, les collectivités et les particuliers.

Pour conclure, la sélectivité sur le frelon commun est proche de 20% des captures totales. Au vu de la pression croissante des frelons communs sur les ruchers, ne faut-il pas continuer à exercer une pression sur les fondatrices de frelons communs qui volent plus tard que les frelons asiatiques à pattes jaunes ?....