


Arrivé en France en 2004, *Vespa velutina* se propage à travers l'Europe

LE FRELON ASIATIQUE

Vespa velutina nigrithorax

L'INSECTE



ABDOMEN 3/4 NOIR

BANDE ORANGÉE

PATTES JAUNES

~ 3 cm

L'HABITAT



49% Milieu urbain



42% Milieu agricole



8% Opportuniste | Majoritairement dans les milieux dégradés, agricoles et urbanisés.

LES PROIES

Spécialiste | Chasse principalement les hyménoptères sociaux. Les proportions varient suivant les habitats.



Les adultes se nourrissent de sucres. Ils chassent majoritairement en été pour nourrir les larves.



LES ABEILLES DOMESTIQUES

La chasse en vol stationnaire assiege la ruche. L'activité des abeilles ralentit, voire s'arrête complètement.

Les colonies d'abeilles ne meurent pas mangées par les frelons mais du manque de réserve en hiver.

Nid primaire

MARS - AVRIL

Hauteur : < 2m

Taille : 7cm



LES NIDS

Nid secondaire

JUILLET - OCTOBRE

Hauteur : > 15m

Taille : 90cm



Entrée latérale caractéristique



La colonie ne vit qu'un an et meurt en hiver, seules les reines hibernent. Les nids ne sont jamais réutilisés d'une année à l'autre.

NE JAMAIS PIÉGER !

PIÉGEAGE INEFFICACE

- Le piégeage n'empêche pas la présence des frelons ni l'implantation des nids.
- Les populations de frelons ne sont pas impactées par le piégeage.



1 FONDATRICE ≠ 1 NID

- Plus de 90 % des reines meurent par la compétition et la sélection naturelle. Le piégeage, même intensif, n'augmente pas ce pourcentage.



NÉFASTE POUR LA BIODIVERSITÉ

- Les pièges tuent plus de 95 % d'insectes locaux, dont des abeilles et de nombreux autres pollinisateurs.

CONTRÔLE LOCAL

- Seuls les apiculteurs peuvent piéger dans leurs ruchers en été, le but est de diminuer la pression de prédation des frelons.

LES BONNES PRATIQUES

EN CAS DE DANGER

- Empêcher l'installation de nids primaires proches des zones d'activité.

Recommandations

- Ne pas s'approcher d'un nid.
- Rester prudent en cas d'allergie.



POUR AIDER LES ABEILLES

- Ne jamais utiliser de pesticides !
- Préserver les micro-habitats et les fleurs sauvages.
- Favoriser la diversité d'abeilles domestiques et sauvages.


Conseils

- Protéger les haies, mares, friches, etc.
- Encourager le fauchage raisonné.
- Construire des hôtels à insectes.



Le frelon asiatique s'est invité dans notre écosystème. La régulation naturelle qui s'installe n'est pas encore suffisante pour contenir les dégâts qu'il occasionne à l'apiculture et à la biodiversité.

Si vous trouvez un nid secondaire chez vous, signalez-le en mairie pour organiser sa destruction.



SOURCES

- De Haan, J., Lallemand, M., Cheneau, P., Calot, C., Bess, J., Bess, J., Perrot, J., & Le Tasseigne, N. C. (2018). Medical consequences of the Asian wasp (*Vespa velutina*) invasion in southwestern France. *Parasites*, 15(2), 205-207.
- Humber, J., & Villemant, C. (2017). Impact sur l'implantation des nids de frelon asiatique (*Vespa velutina*) par les insecticides. *Parasites*, 14(2), 1-6.
- Monneau, R., & Théry, D. (2017). Chasing the queens of the alien predator of honeybees, a water drop in the invader's ocean. *Open Journal of Ecology*, 7(1), 82-94.
- Monneau, R., & Théry, D. (2017). Temporalities: a new invasive predator of honeybees in Europe. *Journal of Pest Science*, 8(2), 1-6.
- Monneau, R., & Théry, D. (2017). *Vespa velutina* nest distribution at a local scale: An 8-year survey of the invasive hornet's predation threat. *Parasites*, 14(2), 1-6.
- Humber, J., & Villemant, C. (2017). Impact sur l'implantation des nids de frelon asiatique (*Vespa velutina*) par les insecticides. *Parasites*, 14(2), 1-6.
- Villemant, C., Humber, J., Monneau, R., Bess, J., & Perrot, J. (2017). Impact des insecticides sur la régulation naturelle de la prédation des frelons asiatiques (*Vespa velutina*) sur les colonies d'abeilles domestiques. *Parasites*, 14(2), 1-6.
- Villemant, C., Humber, J., Monneau, R., Bess, J., & Perrot, J. (2017). Impact des insecticides sur la régulation naturelle de la prédation des frelons asiatiques (*Vespa velutina*) sur les colonies d'abeilles domestiques. *Parasites*, 14(2), 1-6.